

- ステロイドの喉頭への沈着や真菌性喉頭炎が嚔声の原因である。
- × 嚔声の原因としてもっとも頻度の高い悪性腫瘍は甲状腺癌で、非手術的原因の26%を占める。次いで肺癌(11%)、食道癌(7%)が続く。
- × 左反回神経は大動脈弓下面を反回するため、胸部手術によって損傷しやすい。
- 声帯にアミロイド蛋白が沈着し、声帯の粘液波動を阻害すると嚔声を生じる。
- × 還元型ヘモグロビンの絶対量と関連する。歴史的にはチアノーゼが出現する還元型ヘモグロビンの定量が最初に行われた。
- × 還元型ヘモグロビンが5 g/dL以上、酸素飽和度が75%以下、 PaO_2 40 mmHg以下でチアノーゼが出現する。
- 末梢性チアノーゼでは PaO_2 は正常で、動脈血が末梢に到達するまでに還元ヘモグロビンが蓄積される。
- 末梢組織の低灌流による。
- 軽度の低酸素血症であっても還元型ヘモグロビンの絶対量が多くなるため、チアノーゼを認める。
- × 異常ヘモグロビン血症で中枢性チアノーゼが出現することがある。メトヘモグロビンが15%以上になるとチアノーゼが出現する。
- Raynaud現象などに代表されるが、末梢血管収縮によりチアノーゼが出現する。保温のみで改善することもある。
- 爪甲基部の厚み(distal phalangeal depth: DPD)と、DIP関節の厚み(interphalangeal depth: IPD)の比が1以上の場合、ばち指と診断可能である。hyponychial angle(爪と爪甲基部に続く指背面のなす角度)が 190° を超えることも診断に有用である。
- 左右の指先を重ねたとき、通常では爪と爪郭によりひし形の隙間ができるが、ばち指ではこれが消失する。
- 腫瘍や炎症による毛細血管障害を反映し、指末端でPDGF(血小板由来増殖因子)およびVEGFが分泌される機序が考えられている。