

54★★★
☑☑☑

ばち指は COPD 単独では出現しにくい。

55★★★
☑☑☑

左房粘液腫はばち指を合併する。

56★★★
☑☑☑

肝硬変や炎症性腸疾患（クローン病、潰瘍性大腸炎）においてばち指を認める場合がある。

57★★★
☑☑☑

ばち指に四肢長管骨遠位端の骨膜の新生、関節炎を合併すると肺性肥大性骨関節症とよばれる。

58★★★
☑☑☑

肺性肥大性骨関節症は肺小細胞癌に多く合併する。

59★★★
☑☑☑

異所性 ACTH 産生腫瘍として気管支カルチノイド、肺小細胞癌、胸腺癌が知られる。

60★★★
☑☑☑

SIADH は肺扁平上皮癌との合併率が高い。

61★★★
☑☑☑

悪性腫瘍による高 Ca 血症の機序として parathyroid hormone-related peptide (PTHrP) 産生や局所性骨融解の頻度が高い。

62★★★
☑☑☑

悪性腫瘍による高 Ca 血症の診断の補助に、骨吸収マーカーである TRACP-5b や ICTP の測定が有用である。

63★★★
☑☑☑

PTHrP 産生による高 Ca 血症は、固形腫瘍の中では乳癌における発症頻度が高い。

64★★★
☑☑☑

局所性骨融解による高 Ca 血症は、固形腫瘍の中では乳癌における発症頻度が高い。

65★★★
☑☑☑

活性型ビタミン D を産生する疾患としてサルコイドーシスや結核がある。

66★★★
☑☑☑

抗 Hu 抗体症候群は肺小細胞癌との合併が多い。

67★★★
☑☑☑

抗 VGKC 複合体抗体には抗 LGI-1 抗体や抗 CASPR2 抗体が含まれ、いずれも肺扁平上皮癌の合併率が高い。

68★★★
☑☑☑

辺縁性脳炎では作業記憶障害、痙攣発作、人格変化などの辺縁系の障害を示唆する症状が緩徐に進行することが特徴的である。