

- 69★★★
☑☑☑ 辺縁性脳炎では、頭部 MRI の FLAIR 画像にて内側側頭葉に局限する両側性辺縁系病変を認める。
- 70★★★
☑☑☑ 傍腫瘍症候群としてのオプソクローヌス・ミオクローヌス症候群では、抗 Ma2 抗体の発現頻度が最も高い。
- 71★★★
☑☑☑ Lambert-Eaton 症候群 (LEMS) は肺扁平上皮癌に多く合併する。
- 72★★★
☑☑☑ Lambert-Eaton 症候群 (LEMS) では抗 VGCC 抗体が陽性となる。
- 73★★★
☑☑☑ 匍行性迂曲性紅斑 (erythema gyratum repens) は肺癌との合併例が多い。
- 74★★★
☑☑☑ 胸腺腫に合併する皮膚病変として類天疱瘡がある。
- 75★★★
☑☑☑ 抗 MuSK 抗体陽性の重症筋無力症 (MG) 患者では、胸腺切除術が推奨される。
- 76★★★
☑☑☑ Kussmaul 呼吸とは遅く深い努力呼吸である。
- 77★★★
☑☑☑ 肥満低換気症候群では規則正しく大きくゆっくりとした呼吸がみられる。
- 78★★★
☑☑☑ Cheyne-Stokes 呼吸は大脳皮質障害や重症心不全で出現する。
- 79★★★
☑☑☑ 細菌性髄膜炎では大きくゆっくりとした呼吸が出現する。
- 80★★★
☑☑☑ 窒息では振子呼吸がみられる。