

- 辺縁性脳炎の診断基準の1つである。
- × 抗Ri抗体の報告例が多く、次いで抗Hu抗体、抗Yo抗体などが知られる。肺小細胞癌や乳癌の合併例が多い。
- × LEMSの患者の60%は腫瘍を合併し、肺小細胞癌の頻度が最も高い。
- 神経終末に存在する電位依存型カルシウムチャンネルに対する抗体である。
- 急速に進行する年輪状、あるいは縞模様の特異な皮疹を呈する稀な疾患である。内蔵悪性腫瘍の合併例が多く、その中では肺癌が最多である。
- × 胸腺腫は腫瘍随伴性天疱瘡を合併する。他にリンパ腫、慢性骨髄性白血病、Castleman病などが知られている。
- × 抗MuSK抗体陽性の場合、胸腺切除術は推奨されていない。抗アセチルコリン受容体抗体陽性の場合には胸腺切除術が推奨される場合がある。
- 代謝性アシドーシスを呼吸性に代償する際にみられる呼吸で、腎不全や糖尿病性ケトアシドーシスに典型的である。
- × Pickwickian syndromeとも呼ばれる。10秒を超える無呼吸または低呼吸を反復する。
- 数十秒にわたる低換気（無換気）のあとに過呼吸が出現し、これらが周期的に繰り返される。
- × 無呼吸と頻呼吸が不規則に短い周期で繰り返すBiot呼吸が出現する。
- × 振子呼吸は肺結核後遺症などでみられ、吸気時に患側から健側へ、呼気時に健側から患側に縦隔が動く呼吸である。窒息などの胸郭外気道の閉塞では、吸気時に胸郭が膨らみ腹部が凹む奇異性呼吸運動がみられる。