

- 下肢の深部静脈血栓が心臓や肺に存在する右→左シャントを通じて動脈内に流入し、脳梗塞に至る病態である。卵円孔開存も原因となる。
- 手指の掌側に鉄棒のまめ様の皮疹が出現する。抗MDA5抗体陽性となることが多く、すなわちCADMに多い。
- × 限局性強皮症における皮膚硬化は、上肢は前腕以遠、下肢は下腿以遠にとどまる。
- × 蝶形紅斑は全身性エリテマトーデス(systemic lupus erythematosus: SLE)に特徴的な所見である。
- 他にリウマチ熱でも合併する。
- × メカニックハンド(機械工の手)は抗ARS抗体症候群や皮膚筋炎に合併する。
- 肺高血圧は全身性強皮症や混合性結合組織病に合併しやすい。
- × 尋常性狼瘡は皮膚結核の一種で、頸部、頬部に片側性に進行する。
- × 全身性強皮症、混合性結合組織病、Sjögren症候群などでみられるが、関節リウマチでは稀とされる。
- × Gottron徴候は皮膚筋炎に特徴的な所見である。
- × 吸気時に肋間が陥凹し、呼気時に元に戻るという所見で、COPDなどの閉塞性肺疾患に特徴的である。
- × 患側の鎖骨上窩の打診で鼓音が生じ、患側の呼吸音は減弱する。
- × 胸水貯留部位は打診で濁音となるが、その上縁には帯状に鼓音帯を認める(Skoda鼓音帯)。
- 縦隔気腫の12%程度でみられるHamman徴候である。縦隔内の空気が心拍動によって移動することで生じると考えられる。僧帽弁逸脱症との鑑別が必要である。