

IV 検査

重要度

設問

- 1★★★★
☑☑☑ 血中好酸球が増加する疾患として、急性好酸球性肺炎の病初期が挙げられる。
- 2★★★★
☑☑☑ 血清 CRP 上昇は、副腎皮質ステロイドや抗 IL-6 抗体投与下でマスクされる。
- 3★★★★
☑☑☑ 血清 Krebs von den Lungen 6 (KL-6) は上皮性悪性腫瘍で上昇することはない。
- 4★★★★
☑☑☑ 血清 BNP は肺高血圧症による右心不全でも高値となる。
- 5★★★★
☑☑☑ プリックテストは先に被検者に針を刺してからアレルゲンを滴下する。
- 6★★★★
☑☑☑ プリックテストの判定は 1 時間後である。
- 7★★★★
☑☑☑ 皮内テストでは 0.02 mL のアレルゲンを前腕屈側に注射する。
- 8★★★★
☑☑☑ 皮内テストは感度が高い反面、アレルギー症状の誘発や偽陽性が多い。
- 9★★★★
☑☑☑ 血清シアリル Lex-i 抗原 (SLX) は癌の早期診断に適さない。
- 10★★★★
☑☑☑ 血中 progastrin-releasing peptide (proGRP) は、神経特異エノラーゼ (NSE) と比較して感度・特異度ともに低い。
- 11★★★★
☑☑☑ レジオネラ感染症を疑う場合は、PPLO 培地を用いる。
- 12★★★★
☑☑☑ マイコプラズマ感染症を疑う場合は、PPLO 培地を用いる。
- 13★★★★
☑☑☑ 尿中肺炎球菌抗原検査では、一度陽性になった場合は数週間から数ヶ月にわたって陽性が持続することがある。