

- 40★★★ 胸腺腫瘍と胸腺過形成の鑑別には、胸部 MRI の dual-phase T1 強調 gradient echo 法が有用である。
☒☒☒
- 41★★★ 肺血流シンチグラフィでは右左シャントの存在を診断することはできない。
☒☒☒
- 42★★★ 肺換気シンチグラフィでは、肺機能検査では評価できない肺局所換気能の評価が可能である。
☒☒☒
- 43★★★ 骨シンチグラフィは肺癌の骨転移の検索において、PET/CT 検査より有用である。
☒☒☒

44~46
 ★★★

気管支鏡検査時に出血合併症を起こす可能性が低い薬はどれか。

44

☒☒☒

アリスキレン

45

☒☒☒

プラスグレル

46

☒☒☒

エドキサバン

Endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration (EBUS-TBNA)

- 47★★★ TBNA の Rapid on-site cytologic evaluation (ROSE) は保険適応である。
☒☒☒
- 48★★★ 最も多い合併症は出血である。
☒☒☒
- 49★★★ 頸部気管から両側主気管支までの気道に接する非血管性病変が主な標的である。
☒☒☒
- 50★★★ 合併症として縦隔炎は起こらない。
☒☒☒
- 51★★★ 鎮静薬はプロポフォールが第一に勧められている。
☒☒☒
- 52★★★ #5 のリンパ節腫脹は良い適応である。
☒☒☒