

# V 治療

| 重要度          | 設問                                  |
|--------------|-------------------------------------|
| 禁煙治療         | 1 ~ 6                               |
| 1★★★★<br>☑☑☑ | 加熱式タバコには発がん性がない。                    |
| 2★★★★<br>☑☑☑ | 禁煙の際は徐々に1日の喫煙本数を減量するのが良い。           |
| 3★★★★<br>☑☑☑ | 禁煙施行者のうち、半数以上は禁煙補助薬を使用している。         |
| 4★★★★<br>☑☑☑ | バレニクリンは最大量から漸減し、12週間使用する。           |
| 5★★★★<br>☑☑☑ | バレニクリン使用中は自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させない。 |
| 6★★★★<br>☑☑☑ | 電子タバコが急性肺障害を引き起こすことはない。             |
| 7~10<br>★★★★ | 喀痰調整薬と効果の組み合わせで正しいものはどれか。           |
| 7<br>☑☑☑     | アンブロキシソール — 粘膜潤滑                    |
| 8<br>☑☑☑     | エリスロマイシン — 好酸球性気道炎症の抑制              |
| 9<br>☑☑☑     | アセチルシステイン — 粘液溶解                    |
| 10<br>☑☑☑    | カルボシステイン — 粘液修復                     |