

11~12 ★★★	コントローラーとリリーバーの両方に使用可能な喘息吸入薬はどれか。
11 ✓✓✓	ブデソニド / ホルモテロール
12 ✓✓✓	フルチカゾン / ホルモテロール
13★★★ ✓✓✓	アスピリン喘息患者の発作時に全身副腎皮質ステロイドを点滴投与する場合、リン酸エステル型ステロイドを急速静注する。
14★★★ ✓✓✓	吸入ステロイド+長時間作用性 β_2 刺激薬+長時間作用性抗コリン薬の合剤は、慢性閉塞性肺疾患のみに有効である。
15★★★ ✓✓✓	Tiotropium には気管支拡張作用がある。
16★★★ ✓✓✓	Montelukast には気管支拡張作用がある。
17★★★ ✓✓✓	Budesonide には気管支拡張作用がある。
18★★★ ✓✓✓	Formoterol には気管支拡張作用がある。
19★★★ ✓✓✓	Aminophylline には気管支拡張作用がある。
20★★★ ✓✓✓	Omalizumab には気管支拡張作用がある。
21★★★ ✓✓✓	気管支喘息に対するオマリズマブは、在宅自己注射が可能である。
22★★★ ✓✓✓	アミノグリコシド系抗菌薬の殺菌作用は時間依存性である。
23★★★ ✓✓✓	コリスチンは β -ラクタム系、フルオロキノロン系、アミノ配糖体系の3系統の抗菌薬に耐性を示す感染症にのみ使用する。