

- 24★★★
☑☑☑ ニューモシスチス肺炎の予後は非ヒト免疫不全ウイルス患者の方が、ヒト免疫不全ウイルス患者よりも良い。
- 25★★★
☑☑☑ 肺 MAC 症に対する標準治療中に慢性肺アスペルギルス症を合併した場合の第一選択薬は、ボリコナゾールである。
- 26★★★
☑☑☑ 結核治療中に再排菌があり、薬剤耐性獲得が疑われる場合、使用中の薬剤のうち耐性化が疑われる1剤のみを他の薬剤に変更する。
- 27★★★
☑☑☑ 副作用に対する減感作療法が推奨されている抗結核薬はイソニアジドのみである。
- 28★★★
☑☑☑ 抗結核薬内服中の食事制限は不要である。
- 29★★★
☑☑☑ ストレプトマイシンによる薬剤性難聴には遺伝的要素がある。
- 30★★★
☑☑☑ 潜在性結核感染症に対する治療には、イソニアジドまたはリファンピシンを用いる。
- 31★★★
☑☑☑ 潜在性結核感染症に対する治療を開始する際は、保健所へ届け出をする必要がある。
- 32★★★
☑☑☑ 抗結核薬の副作用が懸念される場合、肺 MAC 症に対してクラリスロマイシン単剤を用いる。
- 33★★★
☑☑☑ 肺 MAC 症に対して、抗結核薬とともにアジスロマイシンを併用しても良い。
- 34★★★
☑☑☑ 肺 MAC 症の初期治療レジメンとして、アミカシンリポソーム吸入懸濁液の使用が推奨されている。
- 35★★★
☑☑☑ 非結核性抗酸菌症の一般的な薬剤治療期間は開始から1年間である。
- 36★★★
☑☑☑ COVID-19 に対するイムデビマブとカシリビマブの抗体カクテル療法は、酸素投与を要する患者に有効である。