

- 37★★★
☑☑☑ COVID-19 に対して使用するバリシチニブは、妊婦に対して禁忌である。
- 38★★★
☑☑☑ ファビピラビルは COVID-19 の重症化を抑制する効果がある。
- 39★★★
☑☑☑ イベルメクチンは COVID-19 の重症化を抑制する効果がある。
- 40★★★
☑☑☑ 本邦で COVID-19 に対して保険適用であるステロイド薬は、プレドニゾロンである。
- 41★★★
☑☑☑ ヒドロコルチゾン含糖質コルチコイドと鉱質コルチコイドを同比率で含有する。

気管支鏡治療 42 ~ 64

- 42★★★
☑☑☑ シリコンステント挿入時は硬性気管支鏡を用いる。
- 43★★★
☑☑☑ 気管支サーモプラスティは重症 COPD に適応がある。
- 44★★★
☑☑☑ AERO ステントは抜去可能で、悪性腫瘍に起因する気管または気管支狭窄に適応がある。
- 45★★★
☑☑☑ 光線力学的治療は進行肺癌による気道狭窄に対する症状緩和に有効である。
- 46★★★
☑☑☑ 気道狭窄に対してアルゴンプラズマ凝固法を実施する場合、吸入器酸素濃度を 50% 以上とし、十分な酸素化を保つ。
- 47★★★
☑☑☑ レーザー焼灼術と比較し、アルゴンプラズマ凝固法は気道穿孔のリスクは低い。
- 48★★★
☑☑☑ 気管支鏡実施中の片側肺からの大量出血時は、患側肺の止血処置を行うために患側肺のみを使用した片側換気（片側挿管）を行う。
- 49★★★
☑☑☑ 気管支サーモプラスティによる 1 秒量改善効果、症状改善効果は 2 年以内に消失する。

