

62 ✓✓✓	下横隔膜動脈
63 ✓✓✓	鎖骨下動脈
64 ✓✓✓	前脊随動脈
65★★★ ✓✓✓	化学療法経過中に発生した無熱性好中球減少症には、顆粒球コロニー形成刺激因子 (granulocyte-colony stimulating factor: G-CSF) の治療的投与が必要である。
66★★★ ✓✓✓	発熱性好中球減少症発症率が 20%以上の化学療法レジメンを使用するときは、G-CSF の一次予防的投与が推奨される。
67★★★ ✓✓✓	ペメトレキセド投与時には葉酸の併用が必要である。
68★★★ ✓✓✓	非小細胞肺癌に対してチロシンキナーゼ阻害薬を使用する場合は副腎皮質ステロイドを併用する。
69★★★ ✓✓✓	パフォーマンスステータス (performance status: PS) 3~4 の EGFR 遺伝子変異陽性のⅣ期非小細胞肺癌には、一次治療としてゲフィチニブが推奨される。
70★★★ ✓✓✓	PS2~4 の ALK 融合遺伝子陽性のⅣ期非小細胞肺癌には、一次治療としてアレクチニブが推奨される。
71★★★ ✓✓✓	ROS1 融合遺伝子陽性のⅣ期非小細胞肺癌には、エヌトレクチニブの使用が推奨される。
72★★★ ✓✓✓	肺癌のドライバー遺伝子変異検査には、組織検体が必須である。
73★★★ ✓✓✓	ロルラチニブは肺癌の一次治療で使用可能である。
74★★★ ✓✓✓	ペムプロリズマブは肺癌の一次治療で使用可能である。
75★★★ ✓✓✓	アテゾリズマブは肺癌の一次治療で使用可能である。