

○

○

✕

脊髄梗塞をきたす恐れがあり、塞栓してはならない。

✕

無熱性好中球減少症患者に対し、ルーチンに G-CSF の治療的投与をすべきではない。

○

G-CSF 適正使用ガイドラインの記載通り。肺癌領域ではドセタキセル＋ラムシルマブなどが該当する。

○

骨髄抑制などの有害事象を軽減させる目的で葉酸とビタミン B₁₂ を併用する。

✕

薬剤性肺障害を合併した場合などは副腎皮質ステロイドを使用することがあるが、ルーチンには併用しない。

○

PS2 の場合はゲフィチニブとエルロチニブが、PS3～4 の場合はゲフィチニブのみが推奨されている。

○

アレクチニブは PS 不良の患者に対しても有効性と安全性が報告されている。

○

クリゾチニブまたはエヌトレクチニブの使用が推奨されている。

✕

FoundationOne[®] Liquid CDx がんゲノムプロファイルが保険償還され、血液検体を用いた遺伝子変異検査が可能となった。

○

2021 年に一次治療薬としても承認された。

○

ペムブロリズマブ単剤の一次治療からの適応には tumor proportion score (TPS) $\geq 1\%$ が必要である。

○

細胞障害性抗癌薬との併用またはアテゾリズマブ単剤での投与が可能である。

V