

76★★★
☑☑☑

ドセタキセルは肺癌の一次治療で使用可能である。

77★★★
☑☑☑

癌性疼痛に対してアセトアミノフェンを使用する場合の1日最大量は2400 mgである。

78★★★
☑☑☑

オランザピンは糖尿病患者に禁忌である。

79★★★
☑☑☑

抗癌剤に対する制吐薬としてアプレピタントを使用する場合、併用するデキサメタゾンを減量する。

80★★★
☑☑☑

肺癌に対するビノレルビン単剤療法時は、制吐薬の併用は不要である。

81★★★
☑☑☑

肺癌に対する放射線治療において、V20 (20 Gy 以上照射される正常肺の体積) は安全性と関連する。

82★★★
☑☑☑

I型肺胞上皮はII型肺胞上皮よりも放射線感受性が高い。

83★★★
☑☑☑

放射線同時併用化学療法施行時、縦隔領域が照射内に含まれる場合は、G-CSFの使用は推奨されない。

84★★★
☑☑☑

限局性小細胞肺癌に対する同時化学放射線治療後に、デュルバルマブによる地固め療法を行うことが推奨されている。

85★★★
☑☑☑

切除不能Ⅲ期非小細胞肺癌に対する同時化学放射線治療後に、デュルバルマブによる地固め療法を行うことが推奨されている。

86★★★
☑☑☑

切除不能Ⅲ期非小細胞肺癌に対する同時化学放射線治療では、放射線は可能な限り多く照射することが望ましい。

87★★★
☑☑☑

脊髄の耐容線量は、通常線量分割法で100Gyである。