

88~91 ★★★	肺癌手術について正しいものはどれか。
88 ✓✓✓	在宅酸素療法実施中の患者は手術適応とならない。
89 ✓✓✓	呼吸器併存疾患を有する患者では、術前の一般呼吸機能検査と肺拡散能検査が推奨されている。
90 ✓✓✓	術後予測呼吸機能において 術後予測 1 秒量 < 60% もしくは術後予測拡散能 < 60% の場合、簡易型運動負荷試験を行う。
91 ✓✓✓	間質性肺炎合併肺癌患者において、術前呼吸機能検査によって術後急性増悪の発症を予測することはできない。
92 ★★★ ✓✓✓	舌下免疫療法のうち、保険適応となっているアレルゲンはスギとダニである。
93 ★★★ ✓✓✓	舌下免疫療法は短期間で効果が期待できる。

在宅酸素療法 (Home Oxygen Therapy: HOT) 94 ~ 100	
94 ★★★ ✓✓✓	高二酸化炭素血症をきたす患者には禁忌である。
95 ★★★ ✓✓✓	原因疾患として肺結核後遺症が最も多い。
96 ★★★ ✓✓✓	運動時の目標 SpO ₂ 値は 80% 以上である。
97 ★★★ ✓✓✓	高度慢性呼吸不全症例に対する HOT の適応は、動脈血酸素分圧 60 Torr 以下である。
98 ★★★ ✓✓✓	高流量酸素療法を用いると、酸素濃度の調整が可能である。
99 ★★★ ✓✓✓	二相式気道陽圧による非侵襲的陽圧換気療法では、呼吸仕事量の減少が期待できる。
100 ★★★ ✓✓✓	非侵襲的陽圧換気療法は気道熱傷にも適応となる。

