

× 在宅酸素療法の有無のみでは判断されない。

○

○ 周術期リスクとして高いリスクを有すると判断されるため、簡易型運動負荷試験が推奨されている。

× 肺活量、% 肺活量、肺拡散能と間質性肺炎の術後急性増悪との関連が報告されている。

V

○ 皮下免疫療法の対象アレルゲンはスギ・ダニ・ハウスダスト・ブタクサ・カンジダなどがある（2021 年 12 月時点）。

× 数年の治療期間が推奨されており、即効性は期待できない。

× 高二酸化炭素血症の存在が酸素療法の禁忌にはならない。

× 慢性閉塞性肺疾患が最も多い。

× 運動時の SpO₂ 90%（動脈血酸素分圧 60 Torr）以上を目標とするのが一般的である。

× 対象となる患者は動脈血酸素分圧 55 Torr 以下の者および動脈血酸素分圧 60 Torr 以下で睡眠時または運動負荷時に著しい低酸素血症を来した者であって、医師が HOT を必要であると認めた者である。

○ 高流量酸素療法であるベンチュリーマスクやネーザルハイフロー療法では、酸素濃度の調整が可能である。

○

× 非侵襲的陽圧換気療法は顔面の外傷、熱傷、変形には適応とならない。