

Check ☒ 1回目 月 日 / 124問

Check ☒ 2回目 月 日 / 124問

Check ☒ 3回目 月 日 / 124問

解答

解説

- × 毛細血管は平滑筋を欠く。
- × ガス交換の効率の悪い肺胞への血流を低下させることで換気血流比を改善させようとする生理的な反応である。
- × 肺の小動脈の平滑筋が収縮することによって生じる。
- 逆に肺底部では肺動静脈圧が肺胞気圧を上回る。
- × 血管収縮作用を有する。
- β アドレナリン受容体作動薬であり、 β_2 受容体を刺激することで血管拡張作用を有する。
- × 平均大動脈圧の 100 mmHg に対し平均肺動脈圧は 15 mmHg ほどで 1/5～1/6 となっている。
- × 有効血管床の 50～60% が障害されると肺動脈圧の上昇が出現するとされている。
- 右室肥大に伴う $V_1 \sim V_3$ 誘導の著明な R 波と $V_4 \sim V_6$ 誘導の深い S 波、右房負荷に伴う II、III、 aV_F 誘導での P 波の増高がみられる。
I 誘導の深い S 波と III 誘導の Q 波と陰性 T 波を指す S1Q3T3 パターンは肺塞栓症の特徴的な心電図とされるが、その出現頻度は 11～28% で少ない。
- ×

10