

21~25 ★★★	肺動脈性肺高血圧症 (pulmonary arterial hypertension: PAH) において発現が低下していると考えられるものを3つ選べ。
21 ☑☑☑	可溶性グアニル酸シクラーゼ (soluble guanylate cyclase: sGC)
22 ☑☑☑	エンドセリン 1
23 ☑☑☑	内皮型一酸化窒素合成酵素 (endothelial nitric oxide synthase: eNOS)
24 ☑☑☑	ホスホジエステラーゼ 5 (phosphodiesterase-5: PDE-5)
25 ☑☑☑	プロスタサイクリン (プロスタグランジン I ₂) (prostaglandin I ₂ : PGI ₂)

第6回肺高血圧ワールドシンポジウム (2018 ニース会議) で定められた肺高血圧臨床分類 26 ~ 35

- 26★★★** ☑☑☑ 膠原病に伴う肺高血圧症は 1 群 (肺動脈性肺高血圧症) に分類される。
- 27★★★** ☑☑☑ 動脈管開存症による肺高血圧症は 2 群 (左心系疾患に伴う肺高血圧症) に分類される。
- 28★★★** ☑☑☑ 門脈圧亢進症による肺高血圧症は 5 群 (詳細不明、多因子の機序による肺高血圧症) に分類される。
- 29★★★** ☑☑☑ 骨髄増殖性疾患による肺高血圧症は 1 群 (肺動脈性肺高血圧症) に分類される。
- 30★★★** ☑☑☑ 肺高血圧症の中で最も多いのは 3 群 (肺疾患および / または低酸素血症に伴う肺高血圧症) である。

