

31~35 ★★★	次の膠原病の中で肺高血圧症をきたすことが少ないものはどれか。
31 ☑☑☑	強皮症 (systemic sclerosis: SSc)
32 ☑☑☑	側頭動脈炎
33 ☑☑☑	混合性結合組織病 (mixed connective tissue disease: MCTD)
34 ☑☑☑	全身性エリテマトーデス (systemic lupus erythematosus: SLE)
35 ☑☑☑	シェーグレン症候群
36 ★★★ ☑☑☑	安静時の平均肺動脈圧が 20 mmHg を超えるものを肺高血圧症とする。
37 ★★★ ☑☑☑	三尖弁閉鎖不全症は肺高血圧症をきたすことがある。
38 ★★★ ☑☑☑	僧帽弁閉鎖不全症は肺高血圧症をきたすことがある。
39 ★★★ ☑☑☑	心タンポナーデは肺高血圧症をきたすことがある。
40 ★★★ ☑☑☑	肺血栓塞栓症は肺高血圧症をきたすことがある。
41 ★★★ ☑☑☑	フェンフルラミンは肺動脈性肺高血圧症の原因となる。
42 ★★★ ☑☑☑	イマチニブは肺動脈性肺高血圧症の原因となる。
43 ★★★ ☑☑☑	ダサチニブは肺動脈性肺高血圧症の原因となる。
44 ★★★ ☑☑☑	インターフェロン α は肺動脈性肺高血圧症の原因となる。