

- 45★★★
☑☑☑ 膠原病による肺動脈性肺高血圧症の予後は特発性肺動脈性肺高血圧よりも良好である。
- 46★★★★
☑☑☑ 肺高血圧症と考えられる症例では、換気血流シンチグラフィを行う。
- 47★★★★
☑☑☑ 肺高血圧症と考えられる症例では、呼気一酸化窒素 (NO) の測定を行う。
- 48★★★★
☑☑☑ 肺高血圧症と考えられる症例では、HIV 検査を行う。
- 49★★★★
☑☑☑ 肺高血圧症と考えられる症例では、腹部超音波検査を行う。
- 50★★★★
☑☑☑ 肺高血圧症を疑った場合、ガリウムシンチグラフィが診断に有用である。
- 51★★★★
☑☑☑ 肺高血圧症が存在する場合、重症度に関わらず在宅酸素療法が保険適応である。
- 52★★★★
☑☑☑ マシテンタンはエンドセリン受容体拮抗薬である。
- 53★★★
☑☑☑ リオシグアトは NO 非依存性に cGMP を増加させる。
- 54★★★★
☑☑☑ リオシグアトは肺動脈性肺高血圧症には保険適応がない。
- 55★★★★
☑☑☑ エポプロステノールは持続静注型のプロスタサイクリン製剤である。
- 56★★★★
☑☑☑ エポプロステノールは慢性血栓塞栓性肺高血圧症にも保険適応がある。

