

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>57~61</b><br>★★★  | 肺高血圧症を合併することが少ない呼吸器疾患は次のうちどれか。                             |
| <b>57</b><br>☑☑☑     | 気管支喘息                                                      |
| <b>58</b><br>☑☑☑     | 特発性肺線維症                                                    |
| <b>59</b><br>☑☑☑     | 睡眠時無呼吸症候群                                                  |
| <b>60</b><br>☑☑☑     | COPD                                                       |
| <b>61</b><br>☑☑☑     | 気腫合併肺線維症 (combined pulmonary fibrosis and emphysema: CPFE) |
| <b>62</b> ★★★<br>☑☑☑ | 肺疾患に伴う肺高血圧症の治療としてエンドセリン拮抗薬は有用である。                          |
| <b>63</b> ★★★<br>☑☑☑ | 呼吸不全を伴う肺疾患に伴う肺高血圧症の治療として酸素療法は有用である。                        |
| <b>64</b> ★★★<br>☑☑☑ | SLE に伴う肺高血圧症には免疫抑制剤が第一選択である。                               |
| <b>65</b> ★★★<br>☑☑☑ | 強皮症に伴う肺高血圧症には免疫抑制剤が第一選択である。                                |

## 肺血栓塞栓症

66 ~ 74

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| <b>66</b> ★★★<br>☑☑☑ | 血管内皮障害が発症に関わっている。                 |
| <b>67</b> ★★★<br>☑☑☑ | 発症 24 時間以内のものを急性肺血栓塞栓症とよぶ。        |
| <b>68</b> ★★★<br>☑☑☑ | 検査前の臨床的確率の評価法として Wells スコアが用いられる。 |
| <b>69</b> ★★★<br>☑☑☑ | 臨床重症度分類では心電図所見が重要である。             |