

70★★★★ ☑☑☑	急性期の治療にエドキサバンを用いることができる。
71★★★★ ☑☑☑	急性期の治療にクロピドグレルを用いることができる。
72★★★★ ☑☑☑	急性肺血栓塞栓症でショック状態の場合、初期治療としてカテコラミンの投与を検討する。
73★★★★ ☑☑☑	急性肺血栓塞栓症でショック状態の場合、初期治療として抗凝固療法に加えて血栓溶解療法の併用を検討する。
74★★★★ ☑☑☑	急性肺血栓塞栓症でショック状態の場合、初期治療としてカテーテルによる血栓除去療法を検討する。

深部静脈血栓症 (deep venous thrombosis: DVT) 75 ~ 85

75★★★★ ☑☑☑	発生率は年々増加している。
76★★★★ ☑☑☑	大腿静脈より中枢側の DVT を中枢型とする。
77★★★★ ☑☑☑	臨床的に低確率で血清 D-dimer 値が正常であれば、DVT は否定的である。
78★★★★ ☑☑☑	右下肢よりも左下肢で多く発生する。
79★★★★ ☑☑☑	中枢型 DVT の初期治療にアピキサバンを用いることができる。
80★★★★ ☑☑☑	末梢型 DVT であっても抗凝固療法が必要である。

