

81~85 ★★★	深部静脈血栓症の危険因子として最も高いものはどれか。
81 ☑☑☑	肥満
82 ☑☑☑	悪性腫瘍
83 ☑☑☑	エストロゲン（ピル）
84 ☑☑☑	高リン脂質抗体症候群
85 ☑☑☑	長期臥床

慢性血栓塞栓性肺高血圧症 (chronic thromboembolic pulmonary hypertension: CTEPH)

- 86**★★★
☑☑☑ 50% は急性例が慢性化したものである。
- 87**★★★
☑☑☑ 3 ヶ月以上抗凝固療法を継続しても慢性的に肺高血圧症を呈している場合に診断となる。
- 88**★★★
☑☑☑ 女性に多い。
- 89**★★★
☑☑☑ 好発年齢は 50 歳代である。
- 90**★★★
☑☑☑ プロテイン C やプロテイン S の欠損は原因の 1 つとなる。
- 91**★★★
☑☑☑ 胸部 CT で肺野がモザイクパターンを呈することがある。
- 92**★★★
☑☑☑ 外科的肺動脈内膜摘除術を施行後 1 年経過して再発を認めなければ、抗凝固療法は中止可能である。
- 93**★★★
☑☑☑ 高度の右室機能不全がある場合は、肺動脈内膜摘除術の適応とはならない。

