

× 小細胞癌の化学療法（プラチナ製剤＋エトポシド±アテゾリズマブまたはデュルバルマブ、もしくはプラチナ製剤＋イリノテカン）が適応となる。

○ ゲフィチニブのみ PS 4 でも適応がある。

○ エルロチニブはベバシズマブやラムシルマブとの併用が可能である。

× EGFR-TKI の効果が乏しいので、EGFR ex20 挿入変異には推奨されない。ドライバー遺伝子変異陰性非小細胞癌の治療が適応となる。

× オシメルチニブは T790M 陽性でなくとも、EGFR 遺伝子変異陽性であれば一次治療で使用可能である。

× ダコミチニブは EGFR-TKI である。ALK 融合遺伝子陽性肺癌にはアレクチニブ、セリチニブ、クリゾチニブ、ロルラチニブ、ブリグチニブが適応となる。

○

○ クリゾチニブでは視覚障害、消化器毒性、セリチニブでは消化器毒性、肝機能障害の有害事象がみられる。

○ 認知機能障害の他、ロルラチニブに特徴的な有害事象には高コレステロール血症、高トリグリセリド血症、浮腫がある。

○ エヌトレクチニブは ROS-1 融合遺伝子陽性例と NTRK 融合遺伝子陽性例で使用される。

× ダブラフェニブ＋トラメチニブは BRAF 遺伝子変異陽性例で適応がある。

× MET ex14 skipping に対してテポチニブやカプマチニブが保険適応である。

○ カプマチニブも同様に末梢浮腫、消化器症状などの毒性がある。

11