

39★★★
☑☑☑

中心型早期肺癌は病巣が 3 cm 以下のものが含まれる。

40★★★
☑☑☑

中心型早期肺癌には腺癌が含まれる。

非小細胞肺癌の化学療法（分子標的薬以外）

41～50

41★★★
☑☑☑

PD-L1 tumor proportion score (TPS) 50% 以上の場合は一次治療でニボルマブ単剤が適応となる。

42★★★
☑☑☑

PD-L1 1～49% の場合は一次治療でペムブロリズマブ単剤が適応となる。

43★★★
☑☑☑

一次治療において、プラチナ製剤併用療法＋ペムブロリズマブ / アテゾリズマブは PD-L1 発現率に関係なく適応となる。

44★★★
☑☑☑

ニボルマブ＋イピリムマブ併用療法は PD-L1 発現率に関係なく適応となる。

45★★★
☑☑☑

ニボルマブ＋イピリムマブ併用療法は PS2 以上でも推奨される。

46★★★
☑☑☑

ニボルマブ＋イピリムマブ併用療法では、肺障害の有害事象はみられない。

47★★★
☑☑☑

ベバシズマブの併用は 75 歳以下の非高齢者や PS 0-1 の症例で推奨される。

48★★★
☑☑☑

ベバシズマブは扁平上皮癌への投与が推奨される。

49★★★
☑☑☑

ドセタキセル＋ラムシルマブ併用療法は扁平上皮癌を含む非小細胞肺癌で適応である。

50★★★
☑☑☑

浸潤性粘液腺癌では化学療法が奏功する。

