

111~115 ★★	70 歳女性、PS 1、1 年前に EGFR ex19 欠失陽性の原発性肺腺癌 stage IV と診断された。エルロチニブの内服を開始したが、肝転移の増大を認めた。次に行うこととして誤っているものを 1 つ選べ。
111 ☒ ☒ ☒	エルロチニブ投与前の検体で T790M を検索する。
112 ☒ ☒ ☒	血液検体を用いたリキッドバイオプシーで T790M が陽性だったので、オシメルチニブを開始する。
113 ☒ ☒ ☒	CT や MRI で全身転移の検索を再度行う。
114 ☒ ☒ ☒	殺細胞性抗癌剤を投与する。
115 ☒ ☒ ☒	カルボプラチン+ペメトレキセドを投与する。
116~120 ★★	68 歳女性、PS1、EGFR ex21 L858R 陽性原発性肺腺癌 stage IV に対して一次治療オシメルチニブ投与中に血小板 8.3 万 / μ L に低下した。肝障害はない。易出血性の病変や併存症はない。CT 検査では腫瘍縮小がみられ、RECIST 評価で部分奏功 (Partial Response: PR) であった。対応として正しいものを 1 つ選べ。
116 ☒ ☒ ☒	オシメルチニブにカルボプラチン+ペメトレキセドを追加する。
117 ☒ ☒ ☒	オシメルチニブを継続する。
118 ☒ ☒ ☒	G-CSF 製剤を投与する。
119 ☒ ☒ ☒	血小板を輸血する。
120 ☒ ☒ ☒	骨髓生検を行う。