

12 呼吸調節障害

重要度	設問
睡眠時無呼吸症候群 (sleep apnea syndrome: SAS) 1~15	
1★★★★ ☑☑☑	成人男性の有病率は1~2%である。
2★★★★ ☑☑☑	閉塞性睡眠時無呼吸 (obstructive sleep apnea: OSA) では、無呼吸中にも呼吸努力を伴い、通常はいびきが存在する。
3★★★★ ☑☑☑	中枢性睡眠時無呼吸 (central sleep apnea: CSA) は、無呼吸中に呼吸努力を伴わない。
4★★★★ ☑☑☑	無呼吸低呼吸指数 (apnea hypopnea index: AHI) が20以上の閉塞性睡眠時無呼吸症候群 (obstructive SAS: OSAS) は重症である。
5★★★★ ☑☑☑	OSAを対象とした質問紙として、エプワース眠気尺度などが用いられる。
6★★★★ ☑☑☑	ポリソムノグラフィ (polysomnography: PSG) で $AHI \geq 15$ であれば持続陽圧呼吸療法 (continuous positive airway pressure: CPAP) の適用と判断される。
7★★★★ ☑☑☑	PSGで $AHI < 5$ であればSASの存在は否定的である。
8★★★★ ☑☑☑	保険適用でCPAP療法を行うためにはPSGが必須である。
9★★★★ ☑☑☑	OSAは2型糖尿病発症の独立した危険因子である。
10★★★★ ☑☑☑	$5 \leq AHI < 20$ で自覚症状のある症例は口腔内装置 (oral appliance: OA) の良い適応であり、歯科にて保険適用でOAを作成可能である。
11★★★★ ☑☑☑	OAの長期的副作用として、咬合異常がある。