

Check ☒ 1回目 月 日 / 40問

Check ☒ 2回目 月 日 / 40問

Check ☒ 3回目 月 日 / 40問

解答

解説

- × 3~7% 程度である。男性では40~50歳代が半数以上を占めるが、女性では閉経後に増加する。
- 単にSASと記した場合、閉塞性睡眠時無呼吸症候群を指すことも多い。
- 心不全や脳卒中患者でみられるチェンストークス呼吸はCSAの一種である。
- × $5 \leq \text{AHI} < 15$ は軽症、 $15 \leq \text{AHI} < 30$ は中等症、 $\text{AHI} \geq 30$ は重症である。
- ベルリン質問紙やSTOP-BANG質問紙、STOP質問紙なども用いられる。
- × $\text{AHI} \geq 20$ である。重症度とCPAP保険適用のレベルは基準が異なることに留意する。
- 有症状でAHIが5以上の場合にSASと診断する。
- × 簡易モニター検査にて $\text{AHI} \geq 40$ かつ強い自覚症状があれば、保険適用でCPAP療法を導入可能である。
- OSAと2型糖尿病には肥満や加齢などの共通危険因子があるものの、OSAそのものがインスリン抵抗性に関与すると示唆されている。
- OA療法によってQOLの改善や心血管リスクの低減を期待できる。
- 長期的な副作用に対するインフォームドコンセントが不可欠である。

12