

Check ☒ 1回目 月 日 / 100問

Check ☒ 2回目 月 日 / 100問

Check ☒ 3回目 月 日 / 100問

解答

解説

- × 肺機能検査では肺拡散能の低下と閉塞性換気障害がみられる。
- 無症状の症例から咳嗽、血痰、喘鳴がみられる症例まで様々である。
- 腎血管筋脂肪腫に伴う症状として、血尿、貧血、腹痛がみられることがある。
- × 結節性硬化症 (tuberous sclerosis complex: TSC) に伴って発生することがある (TSC-LAM)。
- × TSC-LAM は男性でも発症する。また、稀に孤発性 LAM も男性に発症する。
- × LAM 細胞の増殖とリンパ管の新生が特徴である。
- × 経気管支肺生検やクライオ生検によって、LAM 細胞の検出が可能である。
- × LAM 細胞クラスターは乳び胸水や乳び腹水中にもみられる。
- D2-40 はリンパ管内皮に特異的なモノクローナル抗体である。その他に α -SMA、HMB45、ER、PR などの免疫染色が有用である。
- 他にも乳び胸水や乳び腹水を減少させる、腎血管筋脂肪腫を縮小させるなどの効果が報告されている。
- LAM 細胞はリンパ管内皮細胞増殖因子である VEGF-C や VEGF-D を強く発現しており、研究レベルであるが血清 VEGF-D がバイオマーカーとして有用である。

13