

24★★★ ☑☑☑	自己免疫性 PAP の原因は抗 M-CSF 抗体である。
25★★★ ☑☑☑	先天性 PAP の原因として、surfactant protein (SP) -B 遺伝子の異常がある。
26★★★ ☑☑☑	血清 CEA が上昇する。
27★★★ ☑☑☑	血清 KL-6 が上昇する。
28★★★ ☑☑☑	気管支肺胞洗浄液が米のとぎ汁様となる。
29★★★ ☑☑☑	間質性肺炎を合併することがある。
30★★★ ☑☑☑	患者の 2/3 が無症状である。
31★★★ ☑☑☑	気管支肺胞洗浄液中に泡沫状マクロファージがみられる。
32★★★ ☑☑☑	重症例では肺機能検査で拘束性換気障害と拡散能の低下がみられる。
33★★★ ☑☑☑	PAP には全肺洗浄が有効である。
34★★★ ☑☑☑	PAP には G-CSF 皮下注が有効である。
35★★★ ☑☑☑	PAP には去痰薬が有効である。
36★★★ ☑☑☑	PAP には副腎皮質ステロイドが有効である。

線毛不動症候群 (immotile cilia syndrome)

37 ~ 41

37★★★ ☑☑☑	内臓逆位、慢性副鼻腔炎、気管支拡張症が 3 徴候である。
38★★★ ☑☑☑	男性不妊の原因となるが、女性不妊の原因にはならない。