

- × 肺の過膨張や air trapping の影響で閉塞性換気障害をきたす。末期には拘束性換気障害もみられる。
- × 主に常染色体劣性遺伝する。発症に関連する 40 以上の原因遺伝子が報告されている。
- 鼻腔一酸化窒素濃度検査は侵襲が少なく、感度、特異度が高いため、欧米のガイドラインでも推奨されている。

- × 胸腔穿刺後 1~2 時間以内に起こりやすい。
- 再膨張性肺水腫は長時間虚脱した肺の急速伸展に伴い引き起こされる肺水腫の病態である。
- ほとんどが病側のみであり、時に両側例もみられる。

-
- × 血漿 VEGF は上昇し、浮腫や胸腹水を生じる。
- AA アミロイドーシス、腎障害、間質性肺炎などを合併すると予後不良となる。
- TAFRO 症候群は血小板減少 (Thrombocytopenia)、全身性浮腫 / 胸水 / 腹水 (Anasarca)、発熱 (Fever)、骨髄細網線維化 (Reticulin fibrosis)、臓器腫大 / 肝腫大 / 脾腫 / リンパ節腫大 (Organomegaly) を特徴とする疾患であり、MCD と臨床像が類似することがある。
- × MCD の発症に関与するヒトヘルペスウイルスは 8 型である (HHV8 関連 MCD)。
- 抗 IL-6 受容体抗体であるトシリズマブが有効である。
- × 可溶性 TNF α / LT α レセプター製剤であり、TNF 受容体へのシグナル伝達を阻害する。

13