

IgG4 関連呼吸器疾患

88 ~ 92

88★★★ 診断基準における、血清 IgG4 のカットオフ値は 135 mg/dL 以上である。
☑☑☑

89★★★ 診断基準における画像的特徴には、肺門縦隔リンパ節腫大は含まれない。
☑☑☑

90★★★ 診断基準における画像的特徴には、胸膜病変は含まれない。
☑☑☑

91★★★ 血清 IgE は高値となることが多い。
☑☑☑

92★★★ 副腎皮質ステロイド治療に対する反応性は良好である。
☑☑☑

93★★★ 気管支結石症の原因は、北米ではコクシジオイデス症が多い。
☑☑☑

94★★★ 日本では、気管支結石症は中葉枝に多い。
☑☑☑

95★★★ 肺胞微石症は末期腎不全による高リン血症が原因である。
☑☑☑

96★★★ 肺胞微石症では肺胞内にリン酸カルシウムを主成分とする微小結石が蓄積する。
☑☑☑

97★★★ 特発性肺鉄血症の治療には副腎皮質ステロイドを用いる。
☑☑☑

98★★★ 嚢胞性線維症は常染色体優性遺伝性疾患であり、欧米白人種に多い。
☑☑☑

99★★★ 嚢胞性線維症では膵臓の外分泌機能不全がみられる。
☑☑☑

100★★★ 嚢胞性線維症では汗の塩化物イオン濃度が上昇する。
☑☑☑