

8★★★
☑☑☑

急性気管支炎の原因微生物としては肺炎球菌が最も多い。

9★★★
☑☑☑

基礎疾患や合併症がない急性気管支炎には通常抗菌薬は不要である。

10★★★
☑☑☑

百日咳の潜伏期間は 7~10 日である。

11★★★
☑☑☑

百日咳は高齢者に感染すると無呼吸発作を引き起こし、致死的になりうる。

12★★★
☑☑☑

百日咳菌は多くの場合、培養検査で検出可能である。

13★★★
☑☑☑

百日咳による急性気管支炎に対してはβラクタム系抗菌薬での治療を行う。

14★★★
☑☑☑

百日咳に対する抗菌薬投与の適応は、基礎疾患のある患者に限られる。

15★★★
☑☑☑

急性細気管支炎は小児で頻度が高く、原因としてはウイルスやマイコプラズマが多い。

16★★★
☑☑☑

RS ウイルス感染症の重症化予防として、全ての乳幼児に遺伝子組み換え抗 RSV 抗体（パリーブズマブ）の投与が推奨される。

17★★★
☑☑☑

急性細気管支炎では全例に抗菌薬を投与する。

18★★★
☑☑☑

急性細気管支炎では全例に気管支拡張薬を投与する。

19★★★
☑☑☑

細菌性肺炎は我が国の死亡原因の 1 位である。

20★★★
☑☑☑

院内肺炎は、入院後 96 時間後以降に発症した肺炎と定義される。