

A-DROP は下記の 5 項目で判断する。本症例は 4 項目を満たし、超重症と判断される。

- ×
- A: 男性 70 歳以上、女性 75 歳以上
 - D: BUN 21 mg/dL 以上または脱水あり
 - R: SpO₂ 90% 以下 (PaO₂ 60 Torr 以下)
 - O: 意識障害あり
 - P: 収縮期血圧 90 mmHg 以下
- (ショックがあれば 1 項目のみでも超重症とする)

-
- 呼吸数 22 回 / 分以上、意識変容、収縮期血圧 100 mmHg 以下の 3 項目のうち 2 項目以上で陽性とする。2021 年に改訂された Surviving Sepsis Campaign guideline では qSOFA のみでの敗血症のスクリーニングを行わないように推奨しており、今後の動向には注意を要する。

- ×
- 市中肺炎における細菌性肺炎と非定型肺炎の鑑別項目として、以下のものがある。6 項目中 4 項目、もしくは①～⑤の 5 項目中 3 項目が合致すると非定型肺炎を疑う。
- ①年齢 60 歳未満
 - ②基礎疾患がない、あるいは軽微
 - ③頑固な咳がある
 - ④胸部聴診上所見が乏しい
 - ⑤喀痰がない、あるいは迅速診断法で原因菌が証明されない
 - ⑥末梢血白血球が 10,000 / μ L 未満である。

-
- 重症市中肺炎の代表的な原因菌であり、起因菌が不明の段階ではこれらを含めた抗菌薬選択が望ましい。