

81★★★ ☑☑☑	グラム染色のみで通常診断可能である。
82★★★ ☑☑☑	レジオネラの培養検査には BCYE α 寒天培地や WYO 寒天培地を用いる。
83★★★ ☑☑☑	レジオネラ尿中抗原検査は感度・特異度とも非常に高く、頻用されている。
84★★★ ☑☑☑	レジオネラ肺炎の治療にはフルオロキノロン系抗菌薬やアジスロマイシンを用いる。

ウイルス性肺炎 85 ~ 91

85★★★ ☑☑☑	免疫状態や成人か小児かによって原因となるウイルスが異なる。
86★★★ ☑☑☑	ペア血清を用いて診断する場合、抗体価が 8 倍以上の場合に感染と診断する。
87★★★ ☑☑☑	インフルエンザウイルス、RS ウイルス、ヒトメタニューモウイルスは迅速診断キットが使用可能である。
88★★★ ☑☑☑	ウイルス性肺炎の CT 所見はウイルスによらず同様である。
89★★★ ☑☑☑	インフルエンザ肺炎ではオセルタミビルやバロキサビルを使用する。
90★★★ ☑☑☑	インフルエンザの合併症リスクとしては、65 歳以上、慢性呼吸器疾患、心血管疾患、妊婦がある。
91★★★ ☑☑☑	ホスカルネットはサイトメガロウイルス肺炎の治療に有効である。

