

肺アスペルギルス症 104 ~ 114

- 104 ★★★
☑☑☑ 最も多いのは *Aspergillus niger* である。
- 105 ★★★
☑☑☑ 侵襲性肺アスペルギルス症と慢性型肺アスペルギルス症に大別される。
- 106 ★★★
☑☑☑ 侵襲性肺アスペルギルス症は血液疾患に対する骨髄移植後や、好中球減少がリスクとなる。
- 107 ★★★
☑☑☑ 重症のインフルエンザ肺炎や COVID-19 に続発することがある。
- 108 ★★★
☑☑☑ 侵襲性肺アスペルギルス症の第一選択薬はミカファンギンである。
- 109 ★★★
☑☑☑ 侵襲性アスペルギルス症では CT での halo sign や air-crescent sign が特徴的とされる。
- 110 ★★★
☑☑☑ 慢性型肺アスペルギルス症の血清診断にはアスペルギルスガラクトマンナン抗原検査が最も有用である。
- 111 ★★★
☑☑☑ 入院患者の慢性型肺アスペルギルス症ではミカファンギンを使用してよい。
- 112~114 ★★★
気管支拡張症の既往のある 62 歳男性。1 年間持続する咳嗽で受診し、CT で右肺下葉に孤立性の空洞および真菌球を指摘された。
- 112
☑☑☑ 侵襲性肺アスペルギルス症が疑われる。
- 113
☑☑☑ 根治には薬剤治療が第一選択である。
- 114
☑☑☑ 残存肺機能が保たれている場合、肺切除の適応である。