

126★★★
☑☑☑

リポソーマルアムテホリシン B が有効である。

127★★★
☑☑☑

局所検体の培養検査で診断可能なことが多い。

128★★★
☑☑☑

抗真菌薬による治療のみで予後は良好である。

129★★★
☑☑☑

ポサコナゾールはムーコルやアスペルギルス、フサリウムに活性を持つアゾール系抗真菌薬である。

130★★★
☑☑☑

ポサコナゾールはポリコナゾールと同様に血中濃度測定を行う。

肺結核症

131 ~ 145

131★★★
☑☑☑

主な感染経路は飛沫感染である。

132★★★
☑☑☑

患者・医療者とも N95 マスクを着用する。

133★★★
☑☑☑

結核菌に感染するとほぼ全例が発症する。

134★★★
☑☑☑

結核菌に感染してから発症までの潜伏期間は 1~2 ヶ月である。

135★★★
☑☑☑

肺結核と診断された場合、全例隔離対象である。

136★★★
☑☑☑

肺結核と診断した後は、病院所在地管轄の保健所に発生届を提出する。

137★★★
☑☑☑

典型的な画像所見としては肺尖部や S⁶ 領域を中心とした空洞影とその周辺の散布影がある。

138★★★
☑☑☑

診断のためには喀痰抗酸菌検査を 1 日 1 回、連続して 5 日間施行することが推奨されている。