

- 150★★★
☑☑☑ 肺 MAC 症の初回治療時には、感受性検査の確認は不要である。
- 151★★★
☑☑☑ 薬剤感受性試験は結核と同様の項目で行う。
- 152★★★★
☑☑☑ 肺 MAC 症は 75 歳以上では原則として治療しない。
- 153★★★★
☑☑☑ 軽症の肺 MAC 症は、クラリスロマイシン単剤治療が検討できる。
- 154★★★★
☑☑☑ *M. abscessus* は *M. abscessus subsp. abscessus*、*M. abscessus subsp. massiliense*、*M. abscessu subsp. bolletti* の 3 つに細分化される。
- 155★★★★
☑☑☑ *M. abscessus subsp. massiliense* は *M. abscessus* の中でも予後が良好である。
- 156★★★★
☑☑☑ モキシフロキサシンは結核に対する保険適応を有する。
- 157★★★★
☑☑☑ ストレプトマイシンの使用時は聴力・腎機能検査を行う。
- 158★★★★
☑☑☑ エタンブトールの投与中は、定期的に視力検査を行う。
- 159★★★★
☑☑☑ エタンブトールの本邦での最大投与量は 1000 mg/ 日である。
- 160★★★★
☑☑☑ 近年デラマニドとベダキリン、クロファジミンが多剤耐性結核の治療薬として承認された。