

- 174★★★
☑☑☑ 糞線虫症は急性呼吸窮迫症候群 (acute respiratory distress syndrome: ARDS) の原因となる。
- 175★★★
☑☑☑ 糞線虫症の第一選択薬はプラジカンテルである。
- 176★★★
☑☑☑ イヌ糸状虫症とリンパ管フィラリア症は昆虫により媒介される。

ニューモシスチス肺炎 177 ~ 188

- 177★★★
☑☑☑ 細胞性免疫不全患者に起こる原虫感染症である。
- 178★★★
☑☑☑ ヒト-ヒト感染が起こりうる。
- 179★★★
☑☑☑ 非 HIV 患者の方が HIV 患者より予後が良い。
- 180★★★
☑☑☑ 空洞性病変を作ることはない。
- 181★★★
☑☑☑ 確定診断は気道検体からの染色鏡検法や PCR 検査による。
- 182★★★
☑☑☑ Diff-quick 染色による菌体の検出率は低い。
- 183★★★
☑☑☑ 血清 β -D グルカンが上昇する。
- 184★★★
☑☑☑ スルファメトキサゾール・トリメトプリム製剤 (ST 合剤) やペンタミジンが有効である。
- 185★★★
☑☑☑ 重症例では副腎皮質ステロイドの併用を行う。
- 186★★★
☑☑☑ 日和見感染の原因となる免疫不全のうち、好中球減少症や液性免疫不全は亜急性~慢性の経過をとる。