

- 28★★★★
☑☑☑ ビタミンD製剤の使用はCOPD増悪のリスク因子である。
- 29★★★★
☑☑☑ COPDは喫煙とは独立した肺癌発症の危険因子である。
- 30★★★★
☑☑☑ 肺癌患者の85%がCOPDを合併している。
- 31★★★★
☑☑☑ 約7%の患者で気管支喘息を合併する。
- 32★★★★
☑☑☑ 肺機能検査で拘束性換気障害がみられる。
- 33★★★★
☑☑☑ 診断には対標準1秒量($\%FEV_1$)を用いる。
- 34★★★★
☑☑☑ スパイロメトリーの正常予測値は身長、体重、性別、年齢を用いて計算される。
- 35★★★★
☑☑☑ スパイロメトリーの正常予測値は世界共通である。
- 36★★★★
☑☑☑ $\%FEV_1 \geq 70\%$ であれば病期分類は0期である。
- 37★★★★
☑☑☑ $50\% \leq \%FEV_1 < 70\%$ であれば病期分類はI期である。
- 38★★★★
☑☑☑ $20\% \leq \%FEV_1 < 50\%$ であれば病期分類はIII期である。
- 39★★★★
☑☑☑ $\%FEV_1 < 30\%$ であれば病期分類はIV期である。
- 40★★★★
☑☑☑ スパイロメトリーでは V_{50}/V_{25} が増大する。
- 41★★★★
☑☑☑ スパイロメトリーでは機能的残気量が増加する。
- 42★★★★
☑☑☑ フロー・ボリューム曲線では下降脚が下に凸となる。
- 43★★★★
☑☑☑ 肺胞拡散能は貧血により上昇する。