

- 44★★★
☑☑☑ 気管支拡張薬の吸入後に1秒量が12%かつ200 mL以上増加する場合はCOPDではない。
- 45★★★
☑☑☑ 呼気一酸化窒素濃度 (FeNO) は上昇することが多い。
- 46★★★
☑☑☑ 呼気中一酸化炭素 (CO) 濃度は上昇することが多い。
- 47★★★
☑☑☑ 広域周波オシレーション法では、気道抵抗を含む呼吸抵抗 [レジスタンス (R)] が上昇する。
- 48★★★
☑☑☑ 広域周波オシレーション法では、弾性と慣性を反映する呼吸リアクタンス (X) は正側にシフトする。
- 49★★★
☑☑☑ CAT 質問表は症状や QOL に関する 6 項目を 0~30 点で評価する。
- 50★★★
☑☑☑ CAT 以外にも IPAG や COPD-PS、ACT などの質問票が使われる。
- 51★★★
☑☑☑ I 型呼吸不全では CO₂ ナルコーシスのリスクが高い。
- 52★★★
☑☑☑ 喀痰中好中球数は気腫の程度や増悪頻度と強い相関がある。
- 53★★★
☑☑☑ 喀痰中好酸球が多い症例では吸入ステロイドの反応性が良い。
- 54★★★
☑☑☑ 末梢血中と喀痰中の好酸球数には正の相関関係が認められる。
- 55★★★
☑☑☑ 末梢血中の白血球数は健常者よりも高値を示す。
- 56★★★
☑☑☑ 心電図では肺性 P 波がみられる。
- 57★★★
☑☑☑ β 遮断薬の投与は禁忌である。
- 58★★★
☑☑☑ 心不全合併例に対して長時間作用性抗コリン薬 (long-acting muscarinic antagonist: LAMA) は禁忌である。