

114 ✓✓✓	LAAは汎細葉型の分布を示すことが多い。
115 ✓✓✓	気腫性病変は上葉の胸膜下優位にみられやすい。
116 ✓✓✓	気道壁の肥厚と、気道内腔の狭小化を認める。
117 ✓✓✓	気腫性病変が乏しい症例は、COPDと診断できない。
118~122 ★★★	COPDの治療方針について、適切なものはどれか。
118 ✓✓✓	Ⅱ型呼吸不全に対して在宅酸素療法を導入する。
119 ✓✓✓	現喫煙者に対して在宅酸素療法を導入する。
120 ✓✓✓	SpO ₂ が常に90%以上保たれていても、呼吸困難感があれば在宅酸素療法を導入する。
121 ✓✓✓	末期呼吸不全に対してモルヒネ製剤を投与する。
122 ✓✓✓	呼吸リハビリテーションの中核は、運動療法とセルフマネジメント教育である、
123~134 ★★★	安定期 COPD の長期管理として、適切なものはどれか。
123 ✓✓✓	長時間作用性抗コリン薬 (LAMA)
124 ✓✓✓	長時間作用性 β_2 刺激薬 (LABA)
125 ✓✓✓	吸入ステロイド薬 (ICS)
126 ✓✓✓	ICS/LAMA/LABA 合剤