

3

気管支・細気管支の疾患

重要度

設問

気管支拡張症

1 ~ 32

- 1★★★★
☑☑☑ 気管支拡張症 (bronchiectasis: BE) における気道の拡張は解剖学的に可逆性である。
- 2★★★★
☑☑☑ BE の主たる原因は特発性と感染後の二次性変化である。
- 3★★★★
☑☑☑ BE には慢性副鼻腔炎の合併が多い。
- 4★★★★
☑☑☑ 自己免疫性疾患に関連する BE は関節リウマチ (rheumatoid arthritis: RA) に合併しやすい。
- 5★★★★
☑☑☑ 化学的な刺激は BE の原因にはならない。
- 6★★★★
☑☑☑ 原発性線毛機能不全 (primary ciliary dyskinesia: PCD) は BE の原因となる。
- 7★★★★
☑☑☑ PCD は常染色体優性遺伝の形式をとる。
- 8★★★★
☑☑☑ PCD の原因遺伝子は全て同定されている。
- 9★★★★
☑☑☑ PCD では内臓逆位が必発する。
- 10★★★★
☑☑☑ Kartagener 症候群は PCD の 1 つと位置付けられている。
- 11★★★★
☑☑☑ PCD のうち、Kartagener 症候群の割合はわずかである
- 12★★★★
☑☑☑ Kartagener 症候群は内臓逆位、気管支拡張症、難治性副鼻腔炎の 3 徴を特徴とする。