

- 13★★★
✓✓✓ PCD のスクリーニングにはサッカリンテストが有用である。
- 14★★★
✓✓✓ PCD の診断には汗テストが有用である。
- 15★★★
✓✓✓ PCD では鼻腔内の一酸化窒素(nitric oxide: NO) 濃度が上昇する。
- 16★★★
✓✓✓ BE の胸部 CT 所見において、隣接する肺動脈の 2 倍以上の拡大が有意な気管支内腔の拡張とされる。
- 17★★★
✓✓✓ BE の胸部 CT 所見において、複数の肺葉で気管支拡張像を示すことは予後不良と関連する。
- 18★★★
✓✓✓ BE において、中葉舌区に気管支拡張を認める例では非結核性抗酸菌症との関連性が高い。
- 19★★★
✓✓✓ BE において緑膿菌の検出の有無は予後と関連しない。
- 20★★★
✓✓✓ %FEV 1 (forced expiratory volume in the first second) < 50% の気流制限は、BE の予後と関連する。
- 21★★★
✓✓✓ BE の慢性期、安定期における呼吸困難の程度は、予後と関連する。
- 22★★★
✓✓✓ BE の重症度の評価として、FACED score や Bronchoectasis Severity Index (BSI) がある。
- 23★★★
✓✓✓ BSI は FACED score を簡略化したスケールである。
- 24★★★
✓✓✓ BE の慢性期では吸入ステロイドが効果的である。
- 25★★★
✓✓✓ BE の慢性期において、気管支拡張薬の有効性が確立している。
- 26★★★
✓✓✓ 喀血を繰り返す BE 症例では、気管支動脈塞栓術 (bronchial artery embolization: BAE) や外科的治療の適応となる。
- 27★★★
✓✓✓ 黄色爪症候群 (yellow nail syndrome: YNS) は、黄色の爪、顔面の浮腫、呼吸器病変 (BE や胸水) の 3 徴を特徴とする。

