

42★★★ ☑☑☑	気道感染の反復は、BO の進行に伴って生じやすい。
43★★★ ☑☑☑	BO の経過中、気胸や縦隔気腫を合併することが多い。
44★★★ ☑☑☑	BO は化学物質の吸入では生じない。
45★★★ ☑☑☑	健康食品でも BO を生じるが、本邦で問題になったことはない。
46★★★ ☑☑☑	BO はポップコーンの製造過程の香料に起因する職業病として問題となったことがある。
47★★★ ☑☑☑	D-ペニシラミンは薬物性 BO を生じる可能性がある。
48★★★ ☑☑☑	ウイルス感染症は BO の原因になりうる。
49★★★ ☑☑☑	細菌感染症に伴って BO が生じることはない。
50★★★ ☑☑☑	膠原病の中では BO は関節リウマチに合併しやすい。
51★★★ ☑☑☑	膠原病の中では BO は強皮症に合併しやすい。
52★★★ ☑☑☑	血液疾患の中では BO は急性白血病に伴うものが多い。
53★★★ ☑☑☑	BO では気管支鏡による経気管支肺生検 (transbronchial lung biopsy: TBLB) で診断可能な例が多い。
54★★★ ☑☑☑	BO の特徴的な病理像は constrictive bronchiolitis である。
55★★★ ☑☑☑	BO の病理像では気道周囲に強い炎症細胞浸潤がみられる。
56★★★ ☑☑☑	BO の病理学的特徴として、病変は両側びまん性に形成され、その分布は巣状・散在性である。

