

- 102★★★
✓✓✓ DPB 症例の喀痰中には、黄色ブドウ球菌が早期から検出される。
- 103★★★
✓✓✓ DPB 症例の喀痰中には、ムコイド型緑膿菌が早期から検出される。
- 104★★★
✓✓✓ 喀痰中にムコイド型緑膿菌が検出されている症例では、DPB 増悪時も同菌が起因菌である可能性が高い。
- 105★★★
✓✓✓ DPB の経過中に非結核性抗酸菌の定着がみられることが多い。
- 106★★★
✓✓✓ DPB の治療ではマクロライド系抗菌薬の少量長期投与が根幹となる。
- 107★★★
✓✓✓ エリスロマイシン以外の 14 員環マクロライドや 15 員環マクロライドは DPB に効果がない。
- 108★★★
✓✓✓ 16 員環マクロライド系抗菌薬は DPB に効果がない。
- 109★★★
✓✓✓ マクロライド系抗菌薬による治療は DPB に対して保険適応外である。
- 110★★★
✓✓✓ マクロライド系抗菌薬の少量長期療法の DPB に対する有効性は、本邦から報告された。
- 111★★★
✓✓✓ DPB の安定期に緑膿菌が定着した場合、スペクトラム的に無効であるため、マクロライド系抗菌薬から感受性のある抗菌薬へ変更する。
- 112★★★
✓✓✓ マクロライド系抗菌薬には好中球性炎症の抑制効果がある。
- 113★★★
✓✓✓ マクロライド系抗菌薬により、気道粘液の過剰分泌が抑制される。
- 114★★★
✓✓✓ DPB の増悪期は喀痰で緑膿菌の検出があっても、起因菌になることはない。
- 115★★★
✓✓✓ 最近の DPB の 5 年生存率は 50% 程度である。
- 116★★★
✓✓✓ DPB は肺移植の適応となりうる。

