


肺嚢胞


117～130

117★★★




放射線学的定義では、肺嚢胞の壁の厚さは1 mm 未満とされる。

118★★★




ブラ、ブレブとは胸膜下の1 cm 未満の異常な含気腔と定義される。

119★★★




病理組織学的定義によると、ブラは臓側胸膜の内側の肺実質内にある含気腔を指す。

120★★★




病理組織学的定義によると、ブレブは臓側胸膜の一部を破壊して胸膜の間に入り込んだ胸膜内の含気腔を指す。

121★★★




巨大ブラ症とは片側胸腔の半分以上を占めるものと定義される。

122★★★




肺泡が小葉間隔壁や胸膜に付着する部分が最も解剖学的に脆弱であり、ブレブを生じやすい。

123★★★




ブラ・ブレブは呼吸細気管支との交通はない。

124★★★




肺嚢胞の検出は胸部単純レントゲン撮影でも容易である。

125★★★




胸部 CT 撮像時に肺嚢胞が検出される確率は年齢とともに上昇する。

126★★★




肺嚢胞は肺気腫の有無や喫煙歴と関連する。

127★★★




40 歳以上で多数の嚢胞がみられる症例では、嚢胞性肺疾患の可能性を考えるべきである。

128★★★




シェーグレン症候群に多発肺嚢胞が合併することがある。

129★★★



肺嚢胞を有する症例に対しては、飛行機の搭乗や趣味程度の登山を制限すべきである。

130★★★



肺嚢胞を有する症例に対しては、スキューバダイビングを制限すべきである。