

4 アレルギー性疾患

重要度	設問
1★★★★ ☑☑☑	喘息には病因アレルゲンが明確な アトピー型 喘息と明確でない 非アトピー型 喘息がある。
2★★★★ ☑☑☑	小児喘息では非アトピー型が多い。
3★★★★ ☑☑☑	喘息は気道狭窄が病態の本体である。
4★★★★ ☑☑☑	喘息は主として 2 型免疫反応が関与する。
5★★★★ ☑☑☑	喘息の気道にはリンパ球、マスト細胞、好酸球の集積がみられる。
6★★★★ ☑☑☑	喘息には Th2 リンパ球や 2 型 自然 リンパ球(ILC2)が関与する。
7★★★★ ☑☑☑	喘息ではマクロファージからのメディエーターにより気流制限、気道過敏性の亢進が生じる。
8★★★★ ☑☑☑	ロイコトリエン C4 (LTC4) 、 TGF-β によって気道平滑筋肥厚が起こる。
9★★★★ ☑☑☑	アトピー型喘息の多くは家塵ダニへの感作である。
10★★★★ ☑☑☑	日本の春季における主なアレルゲンは、スギ花粉とヒノキ花粉である。
11★★★★ ☑☑☑	感作アレルゲンへの曝露はリンパ球の活性化をもたらす。
12★★★★ ☑☑☑	シスチニルロイコトリエンは気道平滑筋を拡張する。
13★★★★ ☑☑☑	Th2細胞から産生されるIL-4、IL-5、IL-13は酸球性炎症を調整する。