

- 14★★★
☑☑☑ 好酸球からのシステイニルロイコトリエンは気流制限に関与する。
- 15★★★
☑☑☑ 好塩基球の major basic protein (MBP) は気道上皮を剥離させ気道過敏性を亢進させる。
- 16★★★
☑☑☑ TGF- β は気道リモデリング形成に関与する。
- 17★★★
☑☑☑ Th2 免疫応答はステロイド感受性を示す。
- 18★★★
☑☑☑ 喘息の症状が夜間から明け方に出現しやすいのは、夜間にコルチゾールとアドレナリンのレベルが低下することが関与している。
- 19★★★
☑☑☑ 感作アレルゲンが同定されない喘息は非アトピー型喘息と呼ばれる。
- 20★★★
☑☑☑ 非アトピー型喘息では ILC2 が関与する。
- 21★★★
☑☑☑ 気道上皮から遊離する IL-33 や TSLP は ILC2 を抑制する。
- 22★★★
☑☑☑ 活性化 ILC2 は IL-5 や IL-13 を産生し好酸球性気道炎症を誘導する。
- 23★★★
☑☑☑ ILC2 はステロイド抵抗性を減弱する。
- 24★★★
☑☑☑ 一部の重症喘息の機序には好中球性炎症がみられる。
- 25★★★
☑☑☑ 一部の重症喘息ではマクロライド系抗菌薬の長期投与が試みられることがある。
- 26★★★
☑☑☑ 急性増悪（喘息の悪化）の要因の多くは薬剤性である。
- 27★★★
☑☑☑ ウイルス感染時の喘息気道では好中球や好酸球集積の増強がみられる。
- 28★★★
☑☑☑ 喘息は中年期に発症する疾患である。
- 29★★★
☑☑☑ 喘息の診断において、確定診断となる客観的な指標はない。