

30~36 ★★★	喘息を疑う症状を選べ。
30 ✓✓✓	喘鳴
31 ✓✓✓	咳嗽
32 ✓✓✓	頻脈
33 ✓✓✓	喀痰
34 ✓✓✓	胸苦しさ
35 ✓✓✓	息苦しさ
36 ✓✓✓	胸痛

37★★★
✓✓✓

喘息の症状の中で最も頻度が高いのは胸苦しさである。

38★★★
✓✓✓

喘息の症状の中で最も特異性の高いのは咳嗽である。

39★★★
✓✓✓

喘息を診断する際は、胸部画像検査で器質的疾患を除外する。

40★★★
✓✓✓

臨床診断として中用量以上の吸入ステロイド薬 (ICS) / 長時間作用性 β_2 刺激薬 (LABA) 配合剤の反応性が重要である。

41★★★
✓✓✓

軽症から中等症の喘息では、中用量 ICS/LABA により 1 ヶ月程度で呼吸機能やコントロール状態の改善が期待できる。

42★★★
✓✓✓

症状が毎日あり日常生活に制限が生じる場合は、高用量 ICS/LABA にボスミン皮下注射の連日投与を検討する。

43★★★
✓✓✓

喘息の補助診断として呼気中一酸化窒素濃度 (FeNO) を測定することが望ましい。

